Apteka Zabobrze - Majowa
Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

AESCIN tabl.powl. 20mg x 30tabl.

Cena: 19,67 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE	30 tabl. (1 blist.po 30 s
POSTAĆ	TABLETKI POWLEKANE
PRODUCENT	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
REJESTRACJA	LEK BEZ RECEPTY
SUBSTANCJA CZYNNA	Escinum

Opis produktu

Opis produktu
Wskazaniem do stosowania preparatu jest przewlekła niewydolność żylna, żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu. Aescin może być także stosowany w leczeniu zapalenia żył kończyn dolnych. Lek wykazuje również skuteczność w profilaktyce i leczeniu krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych, przyspieszając ich wchłanianie jak również zmniejszając prawdopodobieństwo ich występowania, w szczególności po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu. Ponadto dzięki właściwościom uszczelniających śródbłonek naczyń krwionośnych lek poprawia krążenie żylno-limfatyczne.

Działanie
Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym. Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę. W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

Sposób użycia
Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.

W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

Składniki
Alfa-escyna, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian, talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), symetykon emulsja 30%.