Apteka Zabobrze - Majowa
Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

ASCOFER tabl.powl. 200mg x 50tabl.

Cena: 12,56 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE	50 tabl. (2 blist.po 25sz
POSTAĆ	TABLETKI POWLEKANE
PRODUCENT	CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
REJESTRACJA	LEK BEZ RECEPTY
SUBSTANCJA CZYNNA	Ferrosi gluconas

Opis produktu

Opis produktu
Ascofer to lek bez recepty zawierający w 1 tabletce dawkę 200mg żelaza (II) glukonianu, co odpowiada 23,2mg jonów żelaza (II). Wskazaniem do stosowania leku jest potrzeba uzupełnienia niedoborów żelaza w organizmie związanych z utratą krwi, zwiększenie zapotrzebowania organizmu na żelazo, stany związane z zaburzeniami wchłaniania żelaza lub z dietą zawierającą za mało żelaza. Żelazo jest składnikiem białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina) oraz wielu enzymów przenoszących energię. Jego niedobór może zaburzać metabolizm.

Działanie
Niedobory żelaza mogą zaburzać wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Produkt leczniczy Ascofer wskazany jest w:
stanach niedoboru żelaza związane z utratą krwi
stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży karmienia piersią);
stanach związanych z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza

Sposób użycia
Dorośli
Leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku; w znacznych niedoborach 2 tabletki powlekane 4 razy na dobę.
Zapobiegawczo: około 60 mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci
Leczniczo u dzieci w wieku powyżej 3 lat: 4 mg do 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Zapobiegawczo: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Składniki
Żelaza(II) glukonian w dawce 200 mg, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza, kwas askorbowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka Aqua-Polish P red o składzie: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony ¡1172).