Apteka Zabobrze - Majowa
Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

PROCTO-GLYVENOL krem doodbyt. - 30g

Cena: 30,75 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE	30 g (tuba alum.)
POSTAĆ	KREM DOODBYTNICZY
PRODUCENT	RECORDATI IRELAND LTD
REJESTRACJA	LEK BEZ RECEPTY
SUBSTANCJA CZYNNA	Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum

Opis produktu

Opis produktu
Procto-Glyvenol® to krem doodbytniczy na hemoroidy bez recepty. Przeznaczony jest do miejscowego leczenia wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidów. Krem Procto-Glyvenol® zawiera dwie substancje czynne: tribenozyd i lidokainy chlorowodorek. Tribenozyd działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo. Zapobiega również uszkodzeniu śródbłonka naczyń krwionośnych. Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą. Łagodzi przykre dolegliwości związane z hemoroidami, takie jak ból, świąd i pieczenie.

- Skuteczne leczenie hemoroidów.
- Szybka ulga - działa już po 10 minutach!
- Potrójny mechanizm działania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwświądowy.
- Może być stosowany w ciąży (od 4-ego miesiąca) i podczas karmienia piersią.

Sposób użycia
Podanie doodbytnicze.
Krem doodbytniczy na hemoroidy Procto-Glyvenol® należy stosować rano i wieczorem, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.
W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów, krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu, a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.
Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.
Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku. Należy unikać kontaktu leku z oczami.
Nie należy stosować leku doustnie.
Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Składniki
Substancjami czynnymi kremu doodbytniczego na hemoroidy Procto-Glyvenol® są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum). 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku.
Substancjami pomocniczymi są: sorbitanu stearynian (Arlacel 60), makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, kwas stearynowy i woda oczyszczona.